



FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: info@farmachem.gr

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ: CAZA 2.15 Gel bait

Βιοκτόνο (εντομοκτόνο).

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel bait) με 2.15% β/β δραστική ουσία (Imidacloprid), 97,806% β/β βοηθητικές ουσίες. Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.

Κάτοχος της έγκρισης: SHARDA EUROPE B.V.A.

Διανομή: FARMA-CHEM S.A.

Πεδίο εφαρμογής:

Για εσωτερικούς χώρους, εφαρμογή σε επιλεγμένα σημεία δόλωσης.

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης) - Δόση και συχνότητα εφαρμογής:

- i) Για *Blattella germanica* (Γερμανική κατσαρίδα)-Νύμφες, ακμαία. Χαμηλή προσβολή: 0,1 g/m², Υψηλή προσβολή: 0,2 g/m².
- ii) ii) Για *Blatta orientalis* (Ανατολική κατσαρίδα)-Νύμφες, ακμαία. Χαμηλή προσβολή: 0,2 g/m², Υψηλή προσβολή: 0,3 g/m².

1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5 mm.

Έως 6 εφαρμογές ετησίως.

Οδηγίες χρήσης:

1. Πριν από την εφαρμογή, ο χώρος εφαρμογής θα πρέπει να καθαρίζεται από τις διάφορες φυσικές εστίες τροφής κατσαρίδων (σκουπίδια, υπολείμματα τροφίμων) ώστε η γέλη να αποτελέσει την μοναδική πηγή τροφής τους.
2. Εφαρμόστε τη γέλη σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και μεταξύ εστιών τροφών καθώς και σε ζεστά (<50°C) και υγρά σημεία (γωνίες, ρωγμές, σχισμές, αεραγωγούς, πίσω από τις βάσεις των ντουλαπιών και συσκευές, κατά μήκος των σωληνώσεων, κοντά σε σημεία με νερό).
3. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, ελέγξτε τη μολυσμένη περιοχή και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τη γέλη που χρησιμοποιήθηκε καθώς οι κατσαρίδες αφήνουν εκκρίσεις και κόπρανα για να προσελκύσουν άτομα του ίδιου είδους.
4. Τα ξηρά υπολείμματα της γέλης πρέπει να αντικαθίστανται ώστε να διατηρείται η γευστικότητα του προϊόντος.
5. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας, αν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Μέτρα μετριασμού κινδύνου:

1. Αποφύγετε κάθε άσκοπη επαφή με το σκεύασμα. Η λανθασμένη εφαρμογή του σκευάσματος μπορεί να έχει συνέπειες στην υγεία.

2. Μη μολύνετε τρόφιμα, ζωοτροφές, σκεύη φαγητού ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
3. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
4. Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται με ασφάλεια έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της κατανάλωσης από άλλα ζώα ή παιδιά.
5. Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μέθοδος (οι) εφαρμογής:

Τοποθέτηση σταγόνων σε επιλεγμένα σημεία δόλωσης.

Για τη συσκευασία των 10γρ.:

1. Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και σχισμές.
2. Αν εμφανιστεί μεγάλος αριθμός κατσαρίδων ή υπάρχει υποψία για μεγάλο πληθυσμό, εφαρμόστε τη δόση για "υψηλή προσβολή". Αν εμφανιστούν μόνο λίγες ή μεμονωμένες κατσαρίδες, εφαρμόστε τη δόση για "χαμηλή προσβολή".
3. Οι σταγόνες του δολώματος να μην εκτίθενται στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (πχ. θερμαντικά σώματα).

Για τη συσκευασία των 30γρ.:

1. Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και σχισμές.
2. Οι σταγόνες του δολώματος να μην εκτίθενται στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (πχ. θερμαντικά σώματα).

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης:

1. Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
2. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
3. Σταθερότητα στην αποθήκευση: 24 μήνες.

Καταστήματα πώλησης:

Για τη συσκευασία των 10γρ.:

Επιτρέπεται η πώληση από καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και από φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες, κλπ) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από καλλυντικά και φάρμακα. Προορίζεται για ερασιτέχνες χρήστες (μη επαγγελματίες).

Για τη συσκευασία των 30γρ.:

Επιτρέπεται η πώληση μόνο από καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.